

VOGELMILBEN (BLUTMILBEN)

Vogelmilben sind kleine, ca. 1-2mm grosse, weissgraue bis braunrote (nach der Blutmahlzeit) Milben, welche bei Hühnern, Tauben, Gänsen und zahlreichen Wildvogelarten vorkommen. Es gibt zwei verschiedene Arten, wovon die eine tagsüber in **Ritzen, Nestern** und v.a. auf den **Sitzstangenunterseiten** vorkommt und nur während der Nacht die Tiere zur **Blutmahlzeit** aufsucht; die andere Art lebt permanent auf dem Wirt, ist aber in Europa nur selten anzutreffen. Vor allem bei warmem Wetter läuft die Entwicklung der Parasiten sehr rasch ab und die massivsten Befälle kommen daher im Sommer während längerer Hitzeperioden vor. Sicherstes Anzeichen für einen Milbenbefall im Stall ist die **Weigerung der Tiere** abends in den Hühnerstall zurückzukehren; weiter kommt es zu **Teilnahmslosigkeit, Blässe** und **plötzlichen Todesfällen**. Bei toten Tieren sind die Milben in der Schnabelhöhle, **unter den Flügeln** und um die Kloake herum zu finden, bei starkem Befall auf dem ganzen Körper; im Stall findet man sie am leichtesten **unter den Sitzstangen**.

- Vorbeugung: ➤ regelmässig Kontrolle der Sitzstangenunterseiten (rote Verfärbung der Finger oder helle Milben auf den Händen); Fernhalten von Wildvögeln
- Behandlung: ➤ Reinigung des **ganzen** Stalles und Ausspritzen mit einem speziellen Insektizid gegen Vogelmilben.